

TRATAMIENTO DE INVIERNO

Realizar los tratamientos fitosanitarios a partir de yema hinchada (Estado B).

El tratamiento de invierno es recomendable realizarlo en todas las plantaciones de frutales, especialmente en las viejas. Tiene gran importancia para controlar o disminuir los ataques posteriores de algunas plagas o enfermedades como: **Pulgonés, Anarsia, Monilia, Araña y Oídio**.

Recomendaciones a tener en cuenta:

- Se realizarán los tratamientos después de haber podado.
- Los tratamientos de invierno actúan por contacto, por lo que hay que mojar bien todas las partes del árbol, sin olvidar las ramillas más altas.
- El tratamiento no se debe realizar en tiempo lluvioso ni en días de riesgo de helada ni viento. La temperatura debe ser superior a 5°C.

Algunos productos autorizados:



Estado B



Estado C




Estado D

PLAGA/ ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA	*DÓISIS (g o cc/Hl)	FENOLOGÍA
MONILIA	Oxicloruro de cobre 50% WG y WP	400	Estado B/C
	Oxicloruro de cobre 70% SC	180	
	Oxicloruro de cobre 38% SC	500	
	Sulfato cuprocálcico 20% WG y WP	1000	
	Hidróxido cúprico 50% WP	250	
PULGÓN	Acetamiprid 20% SP	35	Estado C/D
	Lambda cihalotrin 10% CS	20	
	Lambda cihalotrin 2,5% WG	80	
	Deltametrin 2,5% EC	50	
	Flonicamid 50% WG	14	

*Dependiendo de la marca comercial la dosis puede variar. Leer la etiqueta del producto.

PIOJO DE SAN JOSE

En las fincas donde se hayan observado daños como el de la imagen, realizar un tratamiento a yema hinchada con:



PLAGA/ ENFERMEDAD	MATERIA ACTIVA	DOSIS (g o cc/Hl)	OBSERVACIONES
PIOJO DE SAN JOSE	Piriproxifen 10% [EC] P/V	37-50	Efectuar 1 aplicación por campaña en pre-floración, sin superar un gasto de 0,3 l/Ha. o en post-floración sin superar un gasto de 0,6 l/Ha.