

TRATAMIENTO CAIDA DE PÉTALOS

Después de la caída de pétalos comienzan los ataques de **pulgón verde**, por tanto, es importante vigilar las plantaciones para detectar los primeros focos y realizar un tratamiento.

Para evitar resistencias es importante alternar los productos insecticidas con diferente número IRAC. Dos productos con el mismo número actúan del mismo modo y eso provoca resistencia.

Algunos insecticidas autorizados

IRAC	MATERIA ACTIVA	DOSIS (g o cc/Hl)
1A	(1) PIRIMICARB 50% WG	75
4A	(2) ACETAMIPRID 20% SG, SP, SL	25
9C	(3) FLONICAMIDA 50% WG	14
3A	(4) DELTAMETRIN 2.5% EC	50
3A	(5) LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% WG	80
3A	(6) LAMBDA CIHALOTRIN 10 % CS	20

- (1) Máximo 1 aplicación con 400 l/ha
- (2) 1 o 2 tratamientos con un intervalo de 20 días.
- (3) Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días.
- (4) Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 14 días.
- (5) Máximo 1 aplicación al inicio de la infestación.
- (6) Realizar 2 aplicaciones.