

BOLETÍN DE AVISOS FITOSANITARIOS Nº 06

Fuente de Pedro Naharro, 6 de mayo de 2025

CULTIVO: VIÑA

- OÍDIO (Erysiphe necator)

El oídio puede atacar a todos los órganos verdes de la vid. Las variedades más sensibles a esta enfermedad son Cencibel o Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot, Macabeo o Chardonnay entre otras.

La estrategia para su control se basa en la prevención.

Es una enfermedad endémica en nuestra zona. El periodo más sensible es el comprendido entre el inicio de la floración y cerramiento del racimo, por lo que es importante vigilar y mantener protegida, si existe riesgo, la plantación durante este tiempo.

El hongo ha pasado el invierno en las yemas y también en los sarmientos, hojas y corteza. La temperatura, humedad e iluminación son condicionantes para su desarrollo. El factor que más influye es la temperatura, a partir de 15°C comienza a ser favorable y entre 25-28°C estaría su óptimo desarrollo, se debe tener en cuenta que por encima de los 35°C se puede detener su evolución y, con más de 40°C puede ser letal. La humedad relativa alta y las lluvias también favorecen sus condiciones de desarrollo.

Los momentos más adecuados de las aplicaciones de forma preventiva serían:

- Brotes entre 10 y 15 cm de longitud (estado fenológico F).
- Al comienzo de la floración (estado fenológico I, 5% de flores abiertas).
- Del cuajado a tamaño guisante (estado fenológico K).
- Al principio del envero (estado fenológico M₁, 5% de granos enverados).

Para la primera aplicación de forma preventiva se recomienda aplicar un caldo volumen de caldo por hectárea de entre 200 – 250 litros.

Y conjugar dos productos con el fin de aumentar la eficiencia del tratamiento. Un producto cuyo modo de acción sea penetrante del grupo químico/familia IBS/Triazoles con un cuyo modo de acción sea de contacto (azufre mojable).

Materia activa	Nombre y casa comercial
Penconazol	Pr. Común
Azufre 80%	Pr. Común

- MILDIU (*Plasmopara viticola*)

La pasada campaña se manifestó este hongo como en forma de “mildiu larvado”, lo que hace que esta campaña debemos de estar muy atentos al mismo.

En nuestra región los años con primaveras lluviosas y temperaturas superiores a 12°C y 1-2 días de lluvia consecutivos de la menos 10 mm, pueden hacer que las oosporas germinen, iniciándose así el periodo de incubación de la contaminación primaria.

Desde la ASV se está siguiendo el desarrollo teórico de mildiu (basado en Goidanich).

El desarrollo y propagación de este hongo depende de la pluviometría y la temperatura.

Es muy importante vigilar los viñedos.

Andrés Ruiz Domínguez
Técnico ASV Ntra. Sra. De La Soledad